

# LAMIDERM®

Trolamine 0,67 pour cent,  
émulsion pour application cutanée



## **Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.**

### **Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **Dans cette notice :**

1. QU'EST-CE QUE LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### **1. QU'EST-CE QUE LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

PROTECTEUR CUTANÉ. (D. Dermatologie)

- Érythèmes secondaires à des traitements radiothérapeutiques.
- Brûlures du premier et du second degré et toute autre plaie cutanée non infectée.

### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?**

#### **N'utilisez jamais LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée dans les cas suivants :**

- Allergie connue à l'un des composants de la préparation,
- Plaie hémorragique (avec saignement),
- Lésion infectée.

### **Faites attention avec LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée:**

Ce médicament n'est pas un protecteur solaire.

En cas de brûlure avec formation de cloque ou de brûlure étendue ou en cas de plaie profonde ou étendue, une consultation médicale est indispensable avant d'appliquer un médicament sur la lésion.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **Grossesse**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Liste des excipients à effet notoire :**

Propylène glycol, Sorbate de potassium, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique (E 219), Parahydroxybenzoate de propyle sodique (E 217).

### **3. COMMENT UTILISER LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?**

#### **- Erythèmes secondaires à des traitements radiothérapeutiques :**

Suivre les recommandations de votre médecin.

En général, 2 à 3 applications quotidiennes, régulièrement espacées, en faisant pénétrer par un léger massage.

#### **- Brûlures du second degré et autres plaies cutanées :**

Une consultation par votre médecin est nécessaire (Voir : Faites attention avec LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée).

Après nettoyage de la plaie, appliquer en couche épaisse en débordant largement la surface de la lésion et renouveler les applications afin de maintenir toujours un excédent d'émulsion sur la lésion.

Recouvrir si besoin d'une compresse humidifiée et terminer le pansement. Ne pas utiliser de pansement absorbant sec.

#### **- Brûlures du premier degré :**

En cas de brûlure étendue, une consultation auprès de votre médecin est indispensable (Voir : Prendre des précautions particulières avec LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée).

Appliquer en couche épaisse jusqu'à refus de la peau. Faire pénétrer par un léger massage.

Renouveler 2 à 4 fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?**

Comme tout produit actif ce médicament peut, chez certaines personnes avoir des effets plus ou moins gênants :

- Douleurs (picotements) modérées et transitoires (15 à 30 minutes) pouvant survenir après l'application,

- Rares allergies de contact,

En raison de la présence de parahydroxybenzoate de méthyle, de propyle, de sorbate de potassium et de propylène glycol, risque d'eczéma de contact ; exceptionnellement, réactions immédiates avec urticaire.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves veuillez en informer votre médecin ou pharmacien.

#### **5. COMMENT CONSERVER LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée après la date de péremption figurant sur la boîte.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.

Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

##### **Que contient LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée ?**

###### **- La substance active est :**

Trolamine ..... 0,670 g

###### **- Les autres composants sont :**

Monostéarate d'éthylène glycol, acide stéarique, palmitate de cétyle, paraffine solide, paraffine liquide légère, perhydrosqualène, huile d'avocat, propylène glycol, alginate de trolamine et de sodium, sorbate de potassium, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, parahydroxybenzoate de propyle sodique, parfum honélia, eau purifiée.

##### **Qu'est-ce-que LAMIDERM 0,67 pour cent, émulsion pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme d'une émulsion pour application cutanée.

Tube aluminium de 80 ml, 140 ml ou 200 ml.

###### **Titulaire :**

###### **GIFRER BARBEZAT**

8 à 10, rue Paul Bert  
69150 DECINES-CHARPIEU

###### **Exploitant :**

###### **GIFRER BARBEZAT**

8-10, rue Paul BERT  
69151 DECINES CEDEX

###### **Fabricant :**

###### **GIFRER BARBEZAT**

8-10, rue Paul BERT  
69151 DECINES CEDEX

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est novembre 2008.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).



CONSIGNE POUVANT  
VARIER LOCALEMENT  
> WWW.CONSIGNESDETFR.FR

