

STÉRILÈNE®

à 0,5 pour cent,
solution pour application locale
Cétrimide



Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?
3. COMMENT UTILISER STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe. Il est utilisé pour la désinfection de la peau.

Ce médicament est préconisé dans :

- l'antiseptie de la peau,
- l'antiseptie des petites plaies superficielles.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée?

N'utilisez jamais STÉRILÈNE 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée dans les cas suivants :

- hypersensibilité connue à l'un des composants,
- ne pas appliquer sur la muqueuse génitale (risque d'ulcérations),
- ce produit ne doit pas être mis en contact avec les yeux et ne doit pas pénétrer dans l'oreille.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec STÉRILÈNE 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée

Mise en garde

- Il faut éviter un traitement sur de grandes surfaces, sur une peau lésée, sous pansement occlusif, en raison du passage de l'antiseptique dans la circulation sanguine. Ces effets sont particulièrement à craindre chez les nourrissons et les enfants en bas âge, car le produit peut être retenu dans les plis de la peau ou au niveau des couches.
- En raison de la nature des composants, ce produit ne doit pas être utilisé pour l'antiseptie des cavités internes (bouche, vagin...).

Précautions d'emploi

- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif.
- Éviter d'employer le cétrimide en même temps qu'un autre antiseptique.
- En cas d'ingestion accidentelle, prévenir rapidement un médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre pharmacien.

Grossesse et Allaitement

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement. Si vous découvrez que vous êtes enceinte, consultez votre médecin, lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre le traitement.

D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?

Employer le produit pur en badigeonnage local sur la zone à traiter.

Dans tous les cas se conformer strictement à l'ordonnance du médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, STÉRILÈNE 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée est susceptible d'avoir des effets indésirables bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Il est possible que survienne :

- en cas d'utilisation accidentelle sous pansement occlusif, des zones érodées ou ulcérées peuvent apparaître sur la peau, il faut immédiatement arrêter le traitement et en avvertir votre médecin.
- rarement : chez certaines personnes allergiques à ce produit, possibilité de réaction de type eczéma, il faut arrêter le traitement et en avvertir votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves veuillez en informer votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER STÉRILÈNE À 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas utiliser STÉRILÈNE à 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur ou sur le flacon.

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient STÉRILÈNE 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée ?

La substance active est :

Cétrimide 0,500 g

Pour 100 ml de solution pour application cutanée.

Les autres composants sont :

Alcool, eau purifiée.

Qu'est-ce-que STÉRILÈNE 0,5 POUR CENT, solution pour application cutanée et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'une solution pour application cutanée.

Flacon de 35 ml.

Titulaire

GIFRER BARBEZAT

8 à 10, rue Paul Bert
69150 DECINES-CHARPIEU

Exploitant

GIFRER BARBEZAT

8-10, RUE PAUL BERT
69153 DECINES CEDEX

Fabricant

GIFRER BARBEZAT

8-10, RUE PAUL BERT
69153 DECINES CEDEX

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est juillet 2012.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESETRI.FR